

Česká pneumologická a ftizeologická společnost, ČLS JEP

Informace o nepovinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC) a informovaný souhlas s nepovinným očkováním

Vážení rodiče,

s účinností od 1. 11. 2010 byla vydána vyhláška č. 299/2010, kterou se zrušilo povinné plošné očkování proti TBC u novorozenců v celé České republice s výjimkou rizikových jedinců.

Očkují se proto pouze děti, které mají dle této vyhlášky vyšší pravděpodobnost vzniku TBC. Očkování proti TBC v rizikové populaci totiž významně snižuje možnost vzniku TBC včetně jejích nejzávažnějších forem. Míra užitečnosti očkování proti TBC klesá s výskytem TBC v dané populaci.

Závažnost rizika infekce TBC je posuzována u dětí již v porodnici a následně pak ještě dětským lékařem a případně odborným plicním lékařem. **Vaše dítě nebylo shledáno rizikovým pro rozvoj tuberkulózy**, a proto jste k očkování proti TBC nebyli pozváni. Pokud si však přejete, je možno očkování proti TBC u Vašeho dítěte provést. Obvykle se nepovinné očkování provádí po 6. měsíci života, nejpozději však v 16 letech. Jedná se ale vždy o očkování první, tzv. primovakcinaci.

Očkování opakované, tzv. revakcinace, kterou si možná z minulosti pamatujete, by neměla být prováděna, neboť nemá žádný přídatný vliv na zamezení TBC infekce. Z tohoto důvodu není doporučována Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ani jinými odbornými společnostmi.

Při očkování proti TBC se užívá živé oslabené vakcíny, která se podává do kůže na levé paži. Po očkování se po 6-8 týdnech může objevit uzlík nebo vrídek do 10 mm v průměru v místě očkování, může se také zvětšit uzlinka v levém podpaží nebo vlevo na krku do velikosti 10 mm. V ojedinělých případech se mohou objevit větší reakce než 10 mm a zhnisání místa očkování nebo uzlin. Očkování bývá zcela výjimečně provázeno i závažnějšími reakcemi, jako je možný výskyt postižení kostí nebo rozsev infekce oslabeným kmenem v případě jedinců se závažnou poruchou obranyschopnosti.

Nepovinné očkování na žádost rodičů dítěte se provádí až v druhé polovině prvního roku věku dítěte. Nevýhodou zařazení nepovinné TBC vakcinace do očkovacího kalendáře dítěte je možnost významného odkladu dalších očkování, a to až o 12 týdnů. Před očkováním je třeba provést tuberkulinový kožní test, aby se vyloučila byť minimální pravděpodobnost infekce TBC po náhodném kontaktu dítěte s TBC. Očkují se jen děti s negativní tuberkulinovou reakcí.



Předseda/President: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 443 560, Fax: 588 442 516, E-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz

Reakci po očkování nelze u žádného jedince jednoznačně předpovědět. Vaše dítě však bude stále pod dohledem dětského lékaře a bude kontrolováno i na pracovišti, kde proběhlo očkování (tzv. kalmetizačním pracovišti). Případné nežádoucí reakce na očkovací látku, které by se vymykaly běžné místní reakci, co nejdříve konzultujte s těmito odborníky.

Po seznámení s výše uvedenými informacemi o přínosech a rizicích očkování proti TBC si vakcinaci mého dítěte přeji. Jsem si vědom všech výše uvedených rizik a komplikací. S vakcinací proti TBC souhlasím.

Jméno, datum narození a adresa pobytu dítěte

.....
.....

Dne

.....

podpis rodiče