

## **Mimoplicní formy tuberkulózy na KNPT v Brně v letech 2006 a 2007**

**- S. Potrepčiaková, A. Hrazdírová, J. Skříčková**

Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno - Bohunice

### **SOUHRN**

Tuberkulóza může kromě dýchacího ústrojí postihnout prakticky kterékoliv tkáň a orgány, její průběh je často nespecifický a diagnostika obtížná. Mimoplicní formy tuberkulózy (TBC) se vyskytují méně často než její plicní formy. V roce 2006 bylo v České republice hlášeno 973 případů tuberkulózy, v 88 % případů se jednalo o plicní formu, ve 12 % případů se jednalo o mimoplicní formu TBC. V roce 2007 bylo v České republice hlášeno 871 případů TBC, 91 % hlášených případů TBC se týkalo dýchacího ústrojí, v 9 % se jednalo o mimoplicní TBC. Cílem práce bylo zhodnocení mimoplicních forem tuberkulózy diagnostikovaných a léčených na Klinice nemocí plicních a TBC (KNPT) v Brně v letech 2006 a 2007. Jednalo se o TBC lymfatických uzlin, peritonea, mozkových plen, jater, urogenitálního systému, kůže, oka, střeva a tuberkulózní parotitidu. V roce 2006 bylo na KNPT v Brně diagnostikovaných 11 pacientů s mimoplicní formou tuberkulózy. Z toho byli 4 muži a 7 žen. Průměrný věk pacientů byl 51,5 let. V roce 2007 bylo diagnostikovaných 8 pacientů s mimoplicní formou tuberkulózy. Z toho byli 3 muži a 5 žen. Průměrný věk pacientů byl 60 let.

**Klíčová slova:** mimoplicní formy tuberkulózy, tuberkulóza plic, *Mycobacterium tuberculosis*