

## **Nové pohledy na farmakoterapii CHOPN**

**- N. Pauk**

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, FN Na Bulovce, 3. LF UK a IPVZ Praha

### **SOUHRN**

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se dnes stala léčitelnou nemocí, zůstává však velmi vážným celosvětovým problémem. V Evropě se pohybuje prevalence mezi 4-10 % u lidí nad 40 let věku. Jedná se však o onemocnění, které je velmi poddiagnostikované a reálně se předpokládá dvojnásobný počet nemocných, navíc se stále stoupající prevalence, zejména u žen. Moderní farmakoterapie dokáže ovlivnit celou řadu parametrů, umožní nemocným kvalitnější život, zlepšuje symptomy, snižuje exacerbace a zdá se, že ovlivňuje pozitivně i mortalitu onemocnění.

Na CHOPN se vynakládá stále větší objem finančních prostředků (více než na astma bronchiale), náklady stoupají s tíží onemocnění, ale nejdražší je léčba exacerbací, která odčerpá až 70 % ročních přímých nákladů na léčbu CHOPN, proto právě prevence exacerbací je jednou ze současných priorit kladených na nová farmaka.

*Klíčová slova: CHOPN, farmakoterapie, bronchodilatancia, fixní kombinace, LABA, LAMA*