

„Dispenzarizace“ pro chronickou obstrukční plicní nemoc v České republice (dlouhodobé sledování)
V. Vondra¹, M Malý²

¹Plicní a alergologické oddělení Praha 5, Smíchov

²Státní zdravotní ústav, Praha

SOUHRN

Na základě podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR byly zhodnoceny dlouhodobé údaje (1975 – 2008) o dispenzarizacích pro chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Detailní data za období let 1994 – 2008 (10. Mezinárodní klasifikace nemocí) byly vyhodnoceny v absolutních číslech a relativních na 100 000 obyvatel. Celkový počet dispenzarizací na 100 000 obyvatel – diagnózy J 41 – J 44 za období 1994 – 2008 stoupl z 1470 na 2406 (+64 %). Rostoucí trend se projevoval u obou pohlaví, přičemž po celé období přetrvávaly vyšší počty dispenzarizovaných mužů nad ženami zhruba 1,5krát. Také stoupal roční počet nových dispenzarizací u obou pohlaví. Z hlediska tíže CHOPN byli v r. 2008 nejčastěji dispenzarizováni nemocní ve 2. (středně těžkém) stadiu a to mezi diagnózami J 41 – J 44 ve 31 % a mezi diagnózami J 42 – J 44 ve 39 %. Bez ohledu na výrazný vzestup dispenzarizací pro CHOPN ve sledovaném období, prezentované údaje potvrzují, že v ČR jsou ve srovnání s odhadovanou prevalencí na CHOPN stále nízké počty dispenzarizovaných na toto onemocnění.

Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), dispenzarizace