

## Výsledky diagnostiky a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc

I. Grygárková<sup>1</sup>, V. Kolek<sup>1</sup>, J. Klein<sup>2</sup>, Č. Neoral<sup>2</sup>, M. Szkorupa<sup>2</sup>, T. Bohanes<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Klinika plicních nemocí a tbc FN OL a LF UP v Olomouci

<sup>2</sup>I. chirurgická klinika FN OL a LF UP v Olomouci

### SOUHRN

**Soubor nemocných a metodika:** Bylo provedeno retrospektivní zhodnocení počtu nově diagnostikovaných pacientů s bronchogenním karcinomem na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc v letech 1993-2008 a následně množství pacientů odeslaných k resekci pro toto onemocnění. Za posledních 10 let (1999-2008) byla provedena podrobná analýza diagnostikovaných onemocnění včetně rozboru histologických typů nádoru a stadií nemoci.

**Výsledky:** Je patrný výrazný nárůst počtu nově diagnostikovaných pacientů s bronchogenním karcinomem (153 pacientů v r. 1993, 203 pacientů v r. 2008). Malobuněčný karcinom tvoří do 20 % všech nově diagnostikovaných případů. V rámci nemalobuněčného karcinomu lze pozorovat postupný nárůst počtu adenokarcinomu, který se v letech 2007 a 2008 stal nejčastěji se vyskytujícím histologickým typem nádoru (34,9 %). Zároveň lze pozorovat nepříznivý trend, kdy významně roste počet nemocných diagnostikovaných v pokročilých stadiích onemocnění (nad 75 % v r. 2007 i 2008).

**Závěry:** Počet pacientů s nově diagnostikovaným bronchogenním karcinomem se na našem pracovišti neustále zvyšuje. Při neklesajícím absolutním počtu operací relativní operabilita v posledních dvou letech mírně poklesla. Může to souviset s nárůstem pacientů diagnostikovaných v inoperabilních stadiích onemocnění IIIB a IV nebo také s větší torakochirurgickou aktivitou okolních pracovišť. Zvýšení operability a délky přežití nemocných by bylo možné při časnější diagnostice nádoru.

*Klíčová slova: bronchogenní karcinom, epidemiologický výskyt, operabilita*