

Studie komorbidity u těžkých forem CHOPN v České republice

- M. Malý¹, V. Vondra²

¹SZÚ, Praha,

²Pneumologické a alergologické oddělení, Praha 5-Smíchov

SOUHRN

CHOPN je převážně nemocí středních a starších věkových skupin. Komorbidity a systémová postižení při CHOPN se dotýkají několika různých orgánů a tkání, zejména kardiovaskulárního systému. Tato studie popisuje komorbiditu u 244 nemocných z České republiky s těžkou CHOPN (170 mužů, 74 žen, průměrný věk 65,7 roku, 59 % bývalých kuřáků, 21 % aktivních kuřáků).

Celkově bylo zjištěno 805 komorbidit, tj. v průměru 3,3 na jeden případ CHOPN. U sledovaných nemocných byly nejčastějšími onemocněními či zdravotními postiženími: hypertenze v 61,5 % případů, městnavé srdeční selhání 29,1 %, diabetes 25,0 %, chronické respirační onemocnění jiné než CHOPN 23,8 %, obezita 22,5 %, onemocnění plicních cév 20,5 %, srdeční arytmie 20,1 %. Prevalence komorbidit a jejich distribuce se lišila mezi pohlavími a věkovými skupinami. Ve výskytu komorbidit nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly mezi III. a IV. stadiem CHOPN. Rozložení komorbidit bylo dále charakterizováno pomocí indexů Charlsonové a Elixhauserové. Průměrná skóre podle Charlsonové dosažené v této studii, byla srovnatelná s jinými studiemi u nemocných s těžkou CHOPN.

Klíčová slova: CHOPN, komorbidita