

Bronchoskopie v intenzivní medicíně v letech 2007-2008

- Y. Staňková, J. Skříčková, P. Šándor

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF Masarykovy univerzity a FN Brno-Bohunice

SOUHRN

Celkem bylo v tomto období provedeno 3 241 bronchoskopií. Urgentních bronchoskopií na JIP (jednotka intenzivní péče), KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) či operačních sálech bylo provedeno 408 (12,6 % z 3 241). Urgentních bronchoskopií na JIP Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy bylo provedeno 97 (2,99 % z 3 241 a 23,77 % ze 408). Ostatní bronchoskopie byly provedeny na jiných pracovištích. Nejčastější indikací byla toaleta bronchů u ventilovaných - 95 případů (23,3 %), atelektáza 71 (17,3 %), difuzní plicní postižení u imunokompromitovaných 59 (14,0 %), difuzní plicní postižení u neimunokompromitovaných 46 (11,3 %). V průběhu bronchoskopie byla nejčastěji provedena BAL (bronchoalveolární laváž) 114 (28,0 %), toaleta tracheobronchiálního stromu u ventilovaného 95 (23,2 %), odstranění hlenové zátky 46 (11,3 %) a výplach 44 (10,7 %).

U 81 z 95 (85,3 %) nemocných došlo po odsátí ke zlepšení respiračních parametrů.

Klíčová slova: bronchoskopie, intenzivní medicína, intenzivní péče