

Zkušenosti s diagnostikou a léčbou maligního mezoteliomu, srovnání období 1990-1999 a 2000-2004 - K. Palatka¹, V. Kolek¹, T. Tichý², K. Musilová²

¹Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, ²Ústav patologie LF UP a FN Olomouc

SOUHRN

Práce se zabývá výskytem, příznaky, diagnostikou, léčbou a prognózou maligního mezoteliomu na severní Moravě. Je prezentována retrospektivní analýza 58 pacientů s tímto nádorem a srovnání charakteristik nemoci ve dvou obdobích 1990-1999 (soubor I) a 2000-2004 (soubor II). V obou souborech se nelišilo zastoupení mužů a žen (54 % vs 46 % v souboru I, 50 % vs 50 % v souboru II), iniciální prezentace nemoci: hydrotorax 82 % vs 83 %, nástěnné zastření 14 % vs 17 %. V obou souborech převažoval pravostranný výpotek (71 % vs 67 %). Ve většině případů byla diagnóza stanovena pomocí necílené biopsie pleury (43 % vs 50 %), dále torakoskopicky (39 % vs 30 %), torakotomicky (7 % vs 1 %) a transparietální punkcí tenkou jehlou (11 % vs 7 %). V souboru II bylo dosaženo lepšího mediánu přežití (13 měsíců vs 11 měsíců) i průměrného přežívání (16,7 měsíce vs 14,1 měsíce). Vzhledem k tomu, že se po dobu studie nezměnila spádová oblast, práce dokumentuje spíše vzestupnou tendenci výskytu na území, kde se azbest dříve zpracovával k výrobě krytin. Tento trend odpovídá představě o dlouhodobé latenci od expozice k projevům onemocnění.

Klíčová slova: maligní mezoteliom pleury, expozice azbestu, diagnostika, léčba