

## **Rakovina plic ve vícečetných malignitách**

T. Horváth<sup>1, 4</sup>, E. Geryk, J. Kozel<sup>3</sup>, R. Štampach<sup>3</sup>, M. Sobotka<sup>1</sup>, M. Horváthová<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, FN Brno, <sup>2</sup>Ekonomické oddělení, Fakulta vědy Masarykovy univerzity, <sup>3</sup>Geografické oddělení, <sup>4</sup>CBC Vznik, Brno, CZ

### **SOUHRN**

Mezi celkem 171 850 případy plicní rakoviny evidovanými v Národním onkologickém registru ČR od roku 1976 do roku 2005 bylo nalezeno 15 331 plicních nádorových multiplicit zahrnujících 3 904 primárních plicních nádorů (3 245 u mužů a 659 u žen) a 11 427 následných případů (8 744 u mužů a 2 683 u žen). Rozbor ukázal vzestup výskytu pokročilých stadií a pokles zachytu časných stadií u pacientů s primární plicní rakovinou i mezi pacienty s následným výskytem primárních plicních malignit během těchto tří dekad.

*Klíčová slova: rakovina plic, mnohočetné malignity, trend*