

Úmrtnost v České a Slovenské republice v roce 2011 a podíly respiračních nemocí

¹M. Malý, ²M. Zvolský, ³E. Rozborilová, ⁴V. Vondra

¹Státní zdravotní ústav, Praha, ²Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, ³Klinika tuberkulózy a plicných chorôb, Martin, ⁴Plicní a alergologické oddělení, Praha 5-Smíchov

SOUHRN

V práci je provedeno porovnání úmrtností v České a Slovenské republice za rok 2011 se zaměřením na respirační příčiny. Podle standardizované úmrtnosti jsou v r. 2011 respirační příčiny nemocí v ČR na 4. místě v pořadí mezi hlavními skupinami příčin úmrtí a v SR na místě třetím. V rámci respiračních onemocnění jsou v ČR na prvním místě plicní malignity (C33, C34) s 53,3 případů na 100 000 obyvatel, na druhém CHOPN (J40–J44) - 23,9/100 000 obyvatel a na místě na třetím záněty plic (J12–J18) 22,3/100 000. Oproti předchozím rokům se zvýšil počet úmrtí na CHOPN a předstihl záněty plic. V SR zaujaly záněty plic druhé místo (37,7/100 000) ihned za plicními malignitami (38,5/100 000); úmrtnost na CHOPN je nižší než v ČR (12,9/100 000). V SR byly záněty plic u žen na prvním místě příčin úmrtí (33,8/100 000). Další podstatné rozdíly ve výskytu příčin úmrtnosti mezi ČR a SR při četnosti úmrtí pod 3/100 000 byly např. u intersticiálních nemocí (ČR 2,4, SR 0,9), respiračních selhání (SR 2,7, ČR 1,0) nebo edému plic (SR 2,0, ČR 0,2).

Klíčová slova: úmrtnost, rok 2011, respirační nemoci