

## VATS lobektómia pre bronchogénny karcinóm

M. Janík, R. Benej, M. Lučenič, P. Juhos, S. Haruštiak

Klinika hrudníkovej chirurgie, SZU a UNB Bratislava

**Úvod:** VATS lobektómia nie je úplne novým chirurgickým postupom. V našich podmienkach však doteraz nebola stále zavedená ako bežný operačný postup. Na pracovisku KHCH po predchádzajúcej stáži na Thoracic Surgery Department v Leuvene v Belgicku zaviedli autori túto metodiku do svojho repertoára. V príspevku opisujú indikácie k takémuto postupu, vlastné skúsenosti a posudzujú vhodnosť tejto operácie v prípade malígneho ochorenia pľúc. Vzhľadom na zatiaľ malý súbor pacientov sa zamerali len na krátkodobé výsledky a zhodnocujú benefit pre pacientov.

**Metodika:** Autori opisujú vlastný operačný postup.

**Výsledky:** Za sledované obdobie bolo vykonaných 17 VATS lobektómií, 3x stredná lobektómia, z toho jedenkrát po TEMPLA, 3x ľavá horná, 5x pravá dolná, 3x pravá horná, 3x ľavá dolná. U ďalších troch pacientov bolo potrebné konvertovať na otvorený výkon pre krvácanie, dvakrát pre rozsiahlejší nález, ako sa predpokladal podľa CT. Pacienti, ktorí podstúpili VATS resekciu pľúc, vyžadovali menšiu pooperačnú analgéziu, perioperačne i pooperačne boli zaznamenané výrazne nižšie krvné straty a odpady do drenov, lepšia pooperačná rehabilitácia, skorší demitus.

**Záver:** VATS lobektómia je vhodnou alternatívou otvorenej resekcie pľúc pre bronchogénny karcinóm vo včasných štádiách ochorenia. Pri nižšej morbidite a mortalite metodika nekompromituje zásady radikality, nebol zaznamenaný žiaden rozdiel v prežívaní pacientov operovaných VATS alebo otvorenou cestou.

*Kľúčové slová: VATS lobektómia, morbidita, mortalita, päťročné prežívanie*