

Kryptogénna organizujúca pneumónia – prognostické ukazovatele

R. Slivka, P. Janík, R. Holečko

Národy ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

SÚHRN

Cieľom našej práce bolo nájsť možné prognostické ukazovatele u pacientov s kryptogénnou organizujúcou pneumóniou (COP).

Do súboru bolo zaradených 51 pacientov (33 žien) s histologicky potvrdeným ochorením. Sledovali sme tieto parametre: pohlavie, vek, klinický obraz ochorenia, výskyt pridružených ochorení a ich liečbu, fajčenie, laboratórne výsledky (zápalové parametre – sedimentačná rýchlosť erytrocytov (FW), C – reaktívny proteín (CRP), anémia, leukocytóza, eozinofília), krvné plyny, funkčné vyšetrenie pľúc vrátane difúznej kapacity pľúc pre oxid uhoľnatý, natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii, vyšetrenie hrudníka počítačovou tomografiou, bronchoskopické vyšetrenie a rozbor bronchoalveolárnej lavážovej tekutiny, spôsob stanovenia diagnózy, liečba kryptogénnej organizujúcej pneumónie, výsledok liečby. Zistili sme nasledovné potenciálne negatívne prognostické ukazovatele: obraz difúzných infiltratívnych zmien na CT hrudníka (senzitivnosť 30 %, špecifickosť 100 %, pozitívna prediktívna hodnota 100 %, negatívna prediktívna hodnota 85,42 %), normálne bunkové zastúpenie v bronchoalveolárnej lavážovej tekutine s normálnym pomerom CD4+ a CD8+ T lymfocytov (senzitivnosť 40 %, špecifickosť 93,75 %, pozitívna prediktívna hodnota 66,67 %, negatívna prediktívna hodnota 83,33 %), opakované relapsy ochorenia (senzitivnosť 60 %, špecifickosť 97,56 %, pozitívna prediktívna hodnota 85,71 %, negatívna prediktívna hodnota 90,91 %).

Kľúčové slová: kryptogénna organizujúca pneumónia, počítačová tomografia, bronchoalveolárna laváž, relapsy, prognostické ukazovatele