

Nekrotizující sarkoidní granulomatóza imitující karcinom plic u pacientky s ulcerózní kolitidou v anamnéze

A. Hajná¹, M. Marel¹, F. Petřík¹, L. Čapková², M. Podrazil³

¹Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol; ²Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, ³Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol

SOUHRN

Nekrotizující sarkoidní granulomatóza je vzácné systémové onemocnění s predilekčním postižením plicního parenchymu, které je některými autory považováno za variantu nodulární sarkoidózy. Diagnóza je založená na histologickém obraze, onemocnění nemá charakteristický klinický, rentgenologický ani laboratorní nález.

U pacientů s idiopatickými střevními záněty je studiemí prokázáno častější postižení plic idiopatickými záněty oproti běžné populaci.

V tomto článku prezentujeme případ mladé pacientky s anamnézou ulcerózní kolitidy, u které bylo na základě CT hrudníku vysloveno podezření na plicní karcinom.

Pacientka byla indikována k plicní lobektomii, histologický nález z plicního resektátu však plicní karcinom nepotvrdil. Po vyloučení infekční etiologie procesu a imunologickém vyšetření byla stanovena diagnóza nekrotizující sarkoidní granulomatózy. Pacientka byla více než deset let bez nutnosti léčby ulcerózní kolitidy, kontrolní gastroenterologické vyšetření nepotvrdilo aktivitu nemoci. Zda mohou mít tato dvě onemocnění u pacientky souvislost, nelze určit, v literatuře je však popisováno zvýšené riziko plicního postižení u pacientů s idiopatickými střevními záněty, navozující myšlenku společného imunopatologického základu.

V průběhu dalšího sledování byl u pacientky popsán zvětšený thymus, budící podezření na thymom, pacientka však odmítla operační řešení a k povaze léze či k možné souvislosti s popsáním onemocněním se tedy nelze vyjádřit.

Klíčová slova: nekrotizující sarkoidní granulomatóza, sarkoidóza, karcinom plic, ulcerózní kolitida, thymom, kazuistika